

***INTOXICACIONES
POR PRODUCTOS
COSMÉTICOS.***

Primeros auxilios

A.-PRODUCTOS PARA EL CABELLO

B.- PRODUCTOS PARA EL CUIDADO DE LA PIEL

C.-COSMETICOS PARA OJOS Y LABIOS

D.-PRODUCTOS PARA LAS UÑAS

E.-PRODUCTOS PARA EL CUIDADO DE LA BOCA

A.- PRODUCTOS PARA EL CABELLO

1.- TINTES CAPILARES

- En caso de ingestión, se recomienda no provocar el vómito y llamar al SIT o acudir a un centro sanitario
- En caso de contacto ocular/cutáneo, se recomienda lavado abundante con agua al menos 15 minutos y acudir a un centro sanitario

2.- DECOLORANTES CAPILARES

- En caso de ingestión, se recomienda no provocar el vómito y llamar al SIT o acudir a un centro sanitario
- En caso de contacto ocular/cutáneo, se recomienda lavado abundante con agua al menos 15 minutos y acudir a un centro sanitario

3.- PRODUCTOS RIZADORES Y ALISADORES DEL CABELLO

- En caso de ingestión, se recomienda no provocar el vómito y llamar al SIT o acudir a un centro sanitario.
- En caso de contacto ocular/cutáneo, se recomienda lavado abundante con agua al menos 15 minutos y acudir a un centro sanitario.

4.- BRILLANTINAS, FIJADORES Y TONICOS CAPILARES

- En caso de ingestión mínima, se recomienda administrar líquidos azucarados. Si la cantidad es alta, además llamar al SIT o acudir a un centro sanitario.
- En caso de contacto ocular, se recomienda lavado abundante con agua durante 10 minutos. Si aparecen síntomas o estos persisten acudir a un centro sanitario.

5.- CHAMPUES

- -En caso de ingestión mínima, se recomienda no provocar el vómito. Se debe administrar aceite vegetal y líquidos. Si la ingestión es alta y/o aparecen vómitos espumosos, se recomienda llamar al SIT o acudir a un centro sanitario.
- -En caso de contacto ocular, se recomienda lavado abundante con agua durante 10 minutos y posterior vigilancia médica.

B. - PRODUCTOS PARA EL CUIDADO DE LA PIEL

1.- JABONES DE TOCADOR Y PREPARADOS DE BAÑO

- En caso de ingestión mínima, se recomienda no provocar el vómito. Se debe administrar aceite vegetal y líquidos. Si la ingestión es alta y/o aparecen vómitos espumosos, se recomienda llamar al SIT o acudir a un centro sanitario.
- En caso de contacto ocular, se recomienda lavado abundante con agua durante 10 minutos y posterior vigilancia médica.

2.- CREMAS PARA LA PIEL

CREMAS HIDRATANTES:

- En caso de ingestión mínima, se recomienda administrar líquidos azucarados. Si la cantidad es alta, además llamar al SIT o acudir a un centro sanitario.
- En caso de contacto ocular, se recomienda lavado abundante con agua durante 10 minutos. Si aparecen síntomas o estos persisten acudir a un centro sanitario.

OTRAS CREMAS (anticelulitis, clarificantes, etc.)

- Llamar al SIT o acudir a un centro sanitario.

3.- CREMAS ANTISOLARES, BRONCEADORES Y FOTOPROTECTORES

- En caso de ingestión mínima, se recomienda administrar líquidos azucarados. Si la cantidad es alta, además llamar al SIT o acudir a un centro sanitario.
- En caso de contacto ocular, se recomienda lavado abundante con agua durante 10 minutos. Si aparecen síntomas o estos persisten acudir a un centro sanitario.

4.- COSMETICOS FACIALES

- En caso de ingestión mínima, se recomienda no provocar el vómito y administrar líquidos azucarados. Si la cantidad es alta, se produce el vómito o existen alteraciones respiratorias, además llamar al SIT o acudir a un centro sanitario.
- En caso de contacto ocular, se recomienda lavado abundante con agua durante 10 minutos. Si aparecen síntomas o estos persisten acudir a un centro sanitario.

5.- DESODORANTES Y ANTITRANSPIRANTES

- En caso de ingestión mínima, se recomienda administrar líquidos azucarados. Si la cantidad es alta, además llamar al SIT o acudir a un centro sanitario.

- En caso de contacto ocular, se recomienda lavado abundante con agua durante 10 minutos. Si aparecen síntomas o estos persisten acudir a un centro sanitario.

6.-PERFUMES, EXTRACTOS, AGUAS PERFUMADAS, LOCIONES Y COLONIAS

- En caso de ingestión mínima, se recomienda administrar líquidos azucarados. Si la cantidad es alta, además llamar al SIT o acudir a un centro sanitario.
- En caso de contacto ocular, se recomienda lavado abundante con agua durante 10 minutos. Si aparecen síntomas o estos persisten acudir a un centro sanitario.

7.- CREMAS Y LOCIONES DEPILATORIAS

- En caso de ingestión, se recomienda no provocar el vómito y llamar al SIT o acudir a un centro sanitario.
- En caso de contacto ocular/cutáneo, se recomienda lavado abundante con agua al menos 15 minutos y acudir a un centro sanitario.

C.-COSMETICOS PARA OJOS Y LABIOS

- En caso de ingestión mínima, se recomienda no provocar el vómito y administrar líquidos azucarados. Si la cantidad es alta, se produce el vómito o existen alteraciones respiratorias, además llamar al SIT o acudir a un centro sanitario.
- En caso de contacto ocular, se recomienda lavado abundante con agua durante 10 minutos. Si aparecen síntomas o estos persisten acudir a un centro sanitario.

D.-PRODUCTOS PARA LAS UÑAS

1.-QUITAESMALTES

- En caso de ingestión, se recomienda no provocar el vómito y llamar al SIT o acudir a un centro sanitario.
- En caso de contacto ocular/cutáneo, se recomienda lavado abundante con agua durante 10 minutos. Si aparecen síntomas o persisten, acudir a un centro sanitario.

2.- ESMALTES DE UÑAS

- En caso de ingestión, se recomienda no provocar el vómito y llamar al SIT o acudir a un centro sanitario.
- En caso de contacto ocular/cutáneo, se recomienda lavado abundante con agua durante 10 minutos. Si aparecen síntomas o persisten, acudir a un centro sanitario.

3.- QUITACUTICULAS

- En caso de ingestión, se recomienda no provocar el vómito y llamar al SIT o acudir a un centro sanitario.
- En caso de contacto ocular/cutáneo, se recomienda lavado abundante con agua durante 15 minutos al menos y acudir a un centro sanitario.

4.- ENDURECEDORES DE UÑAS

- En caso de ingestión, se recomienda no provocar el vómito y llamar al SIT o acudir a un centro sanitario.
- En caso de contacto ocular/cutáneo, se recomienda lavado abundante con agua durante 15 minutos al menos y acudir a un centro sanitario.

5.- OTROS COSMETICOS UNGUEALES

- En caso de ingestión, se recomienda no provocar el vómito y llamar al SIT o acudir a un centro sanitario.
- En caso de contacto ocular/cutáneo, se recomienda lavado abundante con agua y acudir a un centro sanitario.

E.-PRODUCTOS PARA EL CUIDADO DE LA BOCA

1.- DENTIFRICOS

- En caso de ingestión mínima, se recomienda la administración de leche. Si la ingestión es mayor además se recomienda llamar al SIT o acudir a un centro sanitario.
- En caso de contacto ocular, se recomienda el lavado abundante con agua. Si aparecen síntomas o se hacen persistentes acudir a un centro sanitario.

2.- ENJUAGUES Y ELIXIRES BUCALES

- En caso de ingestión mínima, se recomienda administrar líquidos azucarados. Si la cantidad es alta, además llamar al SIT o acudir a un centro sanitario.
- En caso de contacto ocular, se recomienda lavado abundante con agua. Si aparecen síntomas o estos persisten acudir a un centro sanitario.

3.- LIMPIADORES DENTALES

- En caso de ingestión mínima se recomienda no provocar el vómito y la administración de leche. Si la cantidad ingerida es alta, se recomienda no provocar el vómito y llamar al SIT o acudir a un centro sanitario.
- En caso de contacto ocular, se recomienda el lavado abundante con agua, al menos 15 minutos y acudir a un centro sanitario.