



## SERPIENTES VENENOSAS ESPAÑOLAS





El patrón de dibujo o el color NO son rasgos útiles


- A.- Las culebras no venenosas son aglifos, es decir, tienen dientes fijos y carecen de colmillos. En España está la culebra de escalera, entre otras.
- B.- Las viboras son **solenoglifas**, tienen colmillos móviles en la parte anterior del maxilar superior. En España tenemos a *Vipera aspis, Vipera berus o Vipera latastei*.



B.- Las viboras tienen la cabeza triangular y bien diferenciada del cuerpo, las pupilas verticales, las placas pequeñas y dispuestas de forma irregular, la cola corta y rechoncha y bien diferenciada del cuerpo y la longitud menor que las culebras

ATENCIÓN: existen excepciones y pueden confundirse las culebras jóvenes con las víboras.

C.- Las culebras venenosas son opistoglifos, poseen colmillos en la parte posterior del maxilar superior. En España contamos con la culebra de cogulla y la culebra bastarda



Si nos encontramos un **ofidio vivo** en el campo, podríamos distinguirlo por la postura que adopta:

- •Las viboras tienen la cabeza en posición de alerta, levantada, con el hocico hacia arriba
- Las culebras tienen la cabeza apoyada en el suelo o en el tronco

ATENCION: En periodos de muda, las víboras adoptan a veces una postura de reposo.

# ¿CUÁLES SON LOS FACTORES DE RIESGO DE UNA MORDEDURA GRAVE?

- La potencia y cantidad del veneno inoculado: si se trata de una mordedura de ataque o defensiva o de aviso, en la que se inyecta mucho menos veneno
- El peso de la víctima: Es más grave en niños
- La patología previa: ancianos y personas inmunodeprimidas
- La zona de la inoculación: peor pronóstico si el veneno es inyectado en un vaso arterial o venoso o a nivel de la cabeza o el cuello.

### PRIMEROS AUXILIOS

- Tranquilizar a la víctima
- Que no corra ni use la bicicleta para llegar al centro médico.
- Inmovilizar el miembro mordido sin elevarlo.






### PRIMEROS AUXILIOS

- Quitar anillos, pulseras o cualquier prenda que comprima la zona de la mordedura.
- Desinfectar la herida.
- Aplicar frío moderado para disminuir la difusión e inactivar al veneno.
- Si es posible, coger el animal para identificarlo sin aplastar la cabeza. ¡PRECAUCION!: La serpiente puede morder de forma refleja hasta treinta minutos después de muerta.

### ¿QUÉ NO DEBE HACERSE?



HM3F042

- No poner un torniquete: pueden producirse gangrenas y complicar la inflamación.
- No poner hielo directamente sobre la piel para evitar lesiones por congelación.
- No dar alcohol por vía oral ni medicamentos sedantes fuera del hospital.
- No aplicar remedios caseros: barro, hierbas, etc., que pueden facilitar la sobreinfección de la mordedura.

## ¿QUÉ NO DEBE HACERSE?

- No producir incisiones: Son inútiles, peligrosas y aumentan los riesgos de infección y de necrosis.
- No succionar la herida: La succión es ineficaz y el veneno podría absorberse a través de lesiones de la cavidad bucal. Además vamos a contaminar más la herida.
- Existe un aparato extractor del veneno que se pone sobre la mordedura, pero no sustituye nunca el tratamiento en un centro médico.